

MEOPA

mélange équimolaire d'oxygène (50%)
et de protoxyde d'azote (50%)

- Analgésique gazeux
- Délai d'action : 3 min après début de l'inhalation**
- Durée d'action : 3min après arrêt de l'inhalation**
- Métabolisme pulmonaire

Indications

Prévention des actes douloureux de courte durée (<1h)

Ponction lombaire, ponction veineuse chez l'enfant, pansement hyperalgique, petite chirurgie superficielle, réduction de fractures/luxations, accouchement, endoscopie...

Effets indésirables

Paresthésies, vertiges, nausées, angoisse, agitation, trouble des perceptions sensorielles, anémie mégaloblastique (expositions répétées)

Précautions d'emploi

- utilisation dans un local bien ventilé
- administration par un personnel formé
- Contre-indications:** pneumothorax, bulle d'emphysème, accident de plongée, embolie gazeuse, distension gazeuse abdominale, hypertension intracrânienne

FOIE


RAS

REIN

RAS

GROSSESSE

Déconseillé pendant le 1er trimestre



**KALINOX
MEDIMIX**

Bouteille 170 bar

- 20l = 11h30 d'autonomie
- 15l = 9h d'autonomie
- 5l = 3h d'autonomie

Recommandations infodouleur

- Expliquer au patient le but et l'effet du traitement
- Appliquer le masque et demander au patient de respirer normalement
- Poursuivre l'inhalation pendant toute la durée de l'acte
- Vérifier le maintien du contact verbal
- Si perte du contact verbal: retirer le masque