

## 13

## Anesthésiques locaux

INDICATIONS: douleur liée aux soins voir protocoles

fiche 16 ►►

agents	techniques	Délai d'action (min)	Durée d'action	Dose maxi	Commentaires
<b>Lidocaïne 1%</b>	infiltration	< 1 (intradermique) 3-5 (sous-cutanée)	30-60 min	200mg = 20ml	Risque allergique exceptionnel avec la forme sans conservateur
<b>Lidocaïne 1% adrénalinée</b>	infiltration	3-5	30-60 min	500mg = 50 ml	Ne pas infiltrer les extrémités: risque de nécrose
<b>Lidocaïne 5% solution</b>	Temponement muqueuse ou pulvérisation	1-3	30-60 min	200mg = 4 ml	
<b>Lidocaïne 2%</b>	Visqueuse (gel bucal) Gel stérile urétral	2-5 5-10	30-60 min	200 mg	Risque allergique: présence de parabens pour la forme visqueuse
<b>Ropivacaïne 0,75% Naropaine*</b>	Infiltration Bloc nerveux	3-15	60-360 min	200mg	Uniquement pour les gestes complexes et profonds
<b>lidocaïne - prilocaïne (EMLA 5%) crème ou patch à 1g</b>	Application cutanée	60-120	60-120 min	50g	Profondeur d'anesthésie cutanée= 3-5 mm
	Application muqueuse	10	20 min		
<b>VERSATIS* (compresse imprégnée de 700mg de lidocaïne)</b>	Application cutanée en cas d'algie post-zostérienne		24 heures pour une application de 12 heures	3 compresses par 24h	Uniquement sur peau saine Action anti-allodynique sans effet anesthésique

Anesthésiques locaux chez les patients à risque voir

fiche 14 ►►