

DOULEUR AIGUE de l'adulte

- La prescription médicale peut en cas d'URGENCE être remplacée par l'application d'un protocole daté, signé et validé dans le service. Cette prescription doit être confirmée ensuite par écrit
- La douleur aiguë doit toujours être traitée EN URGENCE
- La recherche et le traitement étiologique doivent être conduites rapidement en parallèle mais ne saurait justifier un retard au traitement antalgique

Protocole A:

- traumatisme d'un membre
- colique néphrétique
- lombo-radiculalgie
- arthralgie...

fiche 15A ►►

Protocole B:

- Douleur abdominale
- Douleur pelvienne
- Douleur post-opératoire
- Céphalée (hors migraine)
- Brûlure...

fiche 15B ►►

Protocole C:

- Douleur thoracique
- Syndrome coronaire aigu

fiche 15C ►►

Complément d'antalgie :

- Traumatisme, douleur post-opératoire: ALR, MEOPA
- colique néphrétique, douleur abdo: phloroglucinol
- lombalgie: myorelaxant

Références

- Modalités de la sédation et/ou de l'analgésie en situation extrahospitalière- Conférence d'expert – SFAR, 1999 www.sfar.org
- GEDOU, Groupe d'Experts Douleur Urgence
- PROTAU, Programme de Traitements Antalgiques en Urgence, www.institut-upsa-douleur.org/professionnels/programmes/med_prottau_01.htm

