

# 15A

## DOULEUR AIGUE de l'adulte

### Protocole A

- traumatisme d'un membre
- colique néphrétique
- lombo-radiculalgie
- arthralgies...

#### Si contre-indication aux AINS

- ✓ Hémorragie en cours
- ✓ Ulcère gastrique en évolution
- ✓ Allergie ou asthme aux AINS
- ✓ Insuffisance hépatique ou rénale sévère
- ✓ Grossesse après le 6ème mois

appliquer protocole 15B ►►

**EVALUER LA DOULEUR**

**TRAITEMENT ETIOLOGIQUE**



PARACETAMOL 1g per os  
ou IV sur 15'

+  
KETOPROFENE 100mg IV sur 15'  
ou  
IBUPROFENE 400mg peros

REEVALUER LA DOULEUR  
après 30-45'

EVA < 30  
ou EVS : 1

PARACETAMOL 1g peros  
ou  
IV / 6h

+  
KETOPROFENE 100mg IV /8h  
ou  
IBUPROFENE 400mg peros/8h

PARACETAMOL 1g IV sur 15' /6h

+  
KETOPROFENE 100mg IV /8h

**Titration MORPHINE IV**  
**Bolus 1-3mg / 5min**

① Surveillance rapprochée:  
conscience, respiration

fiche18 ►►

REEVALUER LA DOULEUR  
après 5'

30 ≤ EVA  
ou EVS > 1

EVA < 30  
ou EVS : 1

**RELAJ MORPHINE**

Après 2h  
5-10mg S/C  
ou 10-20mg PO

ou

Immédiat  
PCA-IV

fiche 19 ►►