

15B

DOULEUR AIGUE de l'adulte

Protocole B

- Douleur abdominale
- Douleur pelvienne
- Douleur post-opératoire
- Céphalée (hors migraine)
- Brûlure...

et/ou

contre-indication aux AINS

- ✓ Hémorragie en cours
- ✓ Ulcère gastrique en évolution
- ✓ Allergie ou asthme aux AINS
- ✓ Insuffisance hépatique ou rénale sévère
- ✓ Grossesse après le 6ème mois

EVALUER LA DOULEUR

TRAITEMENT ETIOLOGIQUE

MODEREE
30 ≤ EVA < 60
ou EVS : 1-2

SEVERE
60 ≤ EVA
ou EVS : 3-4

**PARACETAMOL 1 g per os
ou IV sur 15'**

PARACETAMOL 1g IV sur 15' /6h

NEFOPAM 20mg IM ou IV en 15'

**REEVALUER LA DOULEUR
après 30-45'**

**Titration MORPHINE IV
Bolus 1-3mg / 5min**

Ⓢ Surveillance rapprochée:
conscience, respiration

fiche18 ▶▶

EVA < 30
ou EVS : 1

30 ≤ EVA
ou EVS > 1

**REEVALUER LA DOULEUR
après 5'**

TRAMADOL 100mg IV en 15'

**REEVALUER LA DOULEUR
après 30-45'**

30 ≤ EVA
ou EVS > 1

EVA < 30
ou EVS : 1

RELAJ MORPHINE

**PARACETAMOL 1g
peros ou IV / 6h**

**PARACETAMOL 1g
peros ou IV / 6h**

Après 2h
5-10mg S/C
ou 10-20mg PO

Immédiat
PCA-IV

fiche 19 ▶▶

**NEFOPAM 80 à 120mg
perf IV / 24h**

**TRAMADOL 200 à 600mg
Peros ou perf IV / 24h**

Sommaire

www.infodouleur.fr/page2.html