15C DOULEUR AIGUE de l'adulte — *Protocole C*

- Douleur thoracique
- Syndrome coronaire aigu

EVALUER LA DOULEUR + **TRAITEMENT ETIOLOGIQUE**

MODEREE
30 ≤ EVA <60
ou EVS : 1-2

→ **PARACETAMOL 1g per os ou IV sur 15'**

→ **REEVALUER LA DOULEUR après 30-45'**

- EVA < 30 ou EVS : 1 → **PARACETAMOL 1g peros ou IV / 6h**
- 30 ≤ EVA ou EVS > 1 → **Titration MORPHINE IV Bolus 1-3mg / 5 min**

SEVERE
60 ≤ EVA
ou EVS : 3-4

→ **PARACETAMOL 1g IV sur 15' /6h**

+

Titration MORPHINE IV Bolus 1-3mg / 5 min

ⓘ **Surveillance rapprochée: conscience, respiration**

fiche18 ▸▸

→ **REEVALUER LA DOULEUR après 5'**

- 30 ≤ EVA ou EVS > 1 → Titration MORPHINE IV
- EVA < 30 ou EVS : 1 → RELAI MORPHINE

RELAI MORPHINE

- Après 2h: 5-10mg S/C ou 10-20mg PO
- ou
- Immédiat: PCA-IV

fiche 19 ▸▸