

18

TITRATION EN MORPHINE IV chez l'adulte

DOULEUR AIGUE SEVERE
60 ≤ EVA ou EVS : 3-4

Titration MORPHINE IV
Bolus / 5 min
2mg si poids ≤ 60 kg
3mg si poids > 60 kg

PRECAUTIONS si:

• Âge > 75 ans : demi doses
• Insuffisance rénale sévère (clairance créat < 40 ml/min) diminuer les doses et/ou espacer les administrations
• Insuffisance hépatique: ne pas titrer

Surveillance rapprochée +++

PAS D'EFFET INDESIRABLE
REEVALUER LA DOULEUR
après 5'

30 ≤ EVA
ou EVS > 1

EVA < 30
ou EVS : 1

RELAIS MORPHINE

Après 2h
5-10mg S/C
ou 10-20mg PO

ou

Immédiat
PCA-IV
fiche 198

EFFETS INDESIRABLES

Nausées
vomissements

Somnolence
S2 ou S3

ou

FR < 10/min
ou pauses
ou apnées

Dropéridol 0,5 à
1mg IV
Métoclopramide
10 mg IV

STOP MORPHINE

O2 5 l/min

+ou -

NALOXONE

Diluer 1A (0,4mg) dans 10ml
Injecter 1ml IV / 2 min
→ FR > 12/min

SCORE de SOMNOLENCE

- S0 •veillé•
- S1 somnolent par intermittence, facilement •veillable
- S2 somnolent la plupart du temps, •veillable par stimulation verbale
- S3 somnolent la plupart du temps, •veillable par stimulation tactile