

# paracétamol

Analgésique d'action centrale (inhibition Cox 3)

**Délai d'action : 30 à 60 min**

**Durée d'action : 4 à 6 h**

L'effet analgésique maximal correspond à la concentration maximale dans le LCR (2h)

## Posologie

0,5-1 g / 6H per os ou par perf. IV de 15 min

## Effets indésirables

**Hépatotoxicité +++ à partir de 150 mg/prise**

Réactions cutanées allergiques

Thrombopénies allergiques exceptionnelles

## Précautions d'emploi

Interaction avec les AVK

## FOIE

Prudence chez l'alcoolique

Contre-indication formelle si insuffisance hépatique

## REIN

Insuffisance rénale sévère:  
maxi 3g/j + prises / 8h

## GROSSESSE

Pas de contre-indication



500-1000mg

DOLIPRANE  
DAFALGAN  
GELUPRANE  
CLARADOL  
FEBRECTOL

Effervescent

500-1000mg

DOLIPRANE  
EFFERALGAN  
CLARADOL

Suppositoire

600-1000

DOLIPRANE\*  
DAFALGAN  
FEBRECTOL

Lyoc-  
orodispersible  
250-500mg

DOLITABS  
PARALYOC  
EFFERALGANODIS



500-1000mg IV

PERFALGAN

## Recommandations

administrer le paracétamol  
**à horaires fixes de**  
**manière systématique**

**Privilégier la voie orale**