

# anti-inflammatoires non stéroïdiens

Analgesie par inhibition de la cyclooxygénase (cox) 1 et 2

## Posologie

Kétoprofène per os: 150-300mg/j  
Kétoprofène IV: 50-100 mg /12h /perf. de 15min  
Diclofénac per os et suppo : 100-150mg/j  
Acide niflumique per os : 750-1000 mg/j

## Effets indésirables

hémorragie digestive, ulcère gastro-duodéal,  
perforation digestive, allergies, asthme,  
insuffisance rénale aiguë,  
nausées, gastralgies, diarrhée, cystite...

## Précautions d'emploi

***Situations à risque nécessitant une réduction posologique et/ou une surveillance accrue:***

- antécédents de gastrite, ulcère Gastro-duodéal.
- anomalies de l'hémostase,
- patients âgés, déshydratés ou hypovolémiques
- insuffisance cardiaque ou traitement par Inhibiteurs de l'Enzyme de Conversion
- Asthme (la maladie de Fernand-Widal est une contre-indication absolue).
- Les AINS diminuent l'efficacité des diurétiques et augmentent celles des AVK

## FOIE

Contre-indication si  
insuffisance hépatique

## REIN

Contre-indication si  
insuffisance rénale

## GROSSESSE

Contre-indication après 24  
Semaines d'Aménorrhée



Kétoprofène  
PROFENID 50mg  
BIPROFENID 150mg

Diclofénac  
VOLTARENE 50 mg  
VOLTARENE LP  
100mg

Ac niflumique  
NIFLURIL 250mg

Suppositoires

PROFENID 100mg  
NIFLURIL  
400-700mg



PROFENID IV 100mg

## Recommandations

*Lors d'une administration < 5 jours  
en postopératoire, les AINS ne  
majorent pas le risque hémorragique  
(du site opératoire ou digestif)*

*- Ne jamais associer 2 AINS*