

4

néfopam

Analgésique d'action centrale (inhibition du recaptage de la sérotonine, de la noradrénaline et de la dopamine) avec propriétés anticholinergiques faibles

Délai d'action : 15 à 30 min

Durée d'action : 3 à 6 h

Posologie

voie IV : 20mg/ perf de 10min toutes les 4 à 6 h. ou en perf continue

dose maxi 120 mg par jour

voie IM douloureuse : à éviter



ACUPAN

20mg IV ou IM

Effets indésirables

- Sueurs, somnolence, nausées.
- **Effets atropiniques** : bouche sèche, tachycardie, palpitations, vertiges, rétention d'urines, excitabilité, irritabilité
- Toxicomanie: exceptionnelle

Précautions d'emploi

-Eviter l'associations avec les traitements anticholinergiques: atropine, antiparkinsoniens, antispasmodiques, antidépresseurs imipraminiques

Contre-indiqué en cas de confusion, glaucome ou obstacle urétéro-prostatique

FOIE

Réduire la posologie si insuffisance hépatique

REIN

Réduire la posologie si insuffisance rénale

GROSSESSE ALLAITEMENT

Contre-indication

Recommandations

Administrer toujours en décubitus pour éviter la survenue d'effets indésirables
Voie orale déconseillée: absence d'AMM