

# tramadol

**Analgésique bimodal**

**opioïde faible**

**augmente la libération et diminue la recapture**

**De sérotonine et de noradrénaline.**

**50 à 60mg tramadol = 10mg morphine orale**

**Délai d'action : 30 à 45 min**

**Durée d'action : 4 à 6 h (peros ou IV), 12-24h (LP)**

## Posologie

Tramadol (cpm): 1 à 2 cp / 6 h

Tramadol LP: 400mg/j maxi

Tramadol IV 50 à 100mg IV lent / 6h  
ou 300 à 600 mg/j en perf.

## Effets indésirables

nausées-vomissements, sédation, sudation  
vertiges, malaise, constipation

**Syndrome SEROTONINERGIQUE**

(si surdosage et/ou interaction médicament)

**Abaissement du seuil ÉPILEPTOGENE**

**DÉPENDANCE**

## Précautions d'emploi

### FOIE

Insuffisance hépatique : espacer les prises

### REIN

Insuffisance rénale modérée: espacer les prises

### GROSSESSE

**Contre-indication**



ou effervescent  
50mg

**CONTRAMAL  
TOPALGIC  
[générique]**



LP

**CONTRAMAL  
TOPALGIC  
100,150,200mg/12h**

**ZAMUDOL  
50,100,150,  
200mg/12h**

**MONOCRIXO  
100,150,200/24h**

Goutte

1 goutte = 2,5 mg

**CONTRAMAL  
TOPALGIC**



100mg IV

**CONTRAMAL  
TOPALGIC**



Paracétamol 325mg  
Tramadol 37,5mg

**IXPRIM  
ZALDIAR**

## Recommandations

Eviter d'associer

- aux antidépresseurs (.sérotoninergique)
- aux opioïdes (dépression respiratoire)

Déconseillé chez l'épileptique,  
l'insuffisant respiratoire

La forme goutte peut être utile pour  
l'adaptation posologique